



**Erklæring om fortrolighed og databeskyttelse**

De oplysninger, du opgiver, vil blive håndteret i overensstemmelse med Sobis databeskyttelsespolitik og i henhold til de formål, for hvilke de gives. Du kan finde komplet information om, hvordan persondata beskyttes af Sobi her: <https://sobi.dk/privatlivspolitik>. Hvis du ikke accepterer disse anvendelser af dine oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger på hjemmesiden

## INFORMATION TIL DEN BEHANDLENDE LÆGE

Denne patient har fået ordineret ASPAVELI® (pegcetacoplan), som kan øge patientens risiko for alvorlige bakterieinfektioner som f.eks. *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* og *Haemophilus influenzae* type B-infektioner.

- Alvorlige bakterieinfektioner kan hurtigt blive livstruende eller dødelige, hvis de ikke opdages og behandles tidligt.
- Patienter skal overvåges nøje for tidlige tegn og symptomer på alvorlig infektion og evalueres øjeblikkeligt, hvis der er mistanke om infektion. Kendte infektioner skal behandles straks.
- Kontakt patientens ordinerende læge snarest muligt ved mistanke om alvorlig infektion.

Se det komplette produktresumé for yderligere oplysninger om ASPAVELI®.

Kontakt Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk) for at indberette bivirkninger eller betænkeligheder vedrørende sikkerhed.

Patienter, der behandles med ASPAVELI®, skal altid bære dette kort på dem. Patienter skal vise referencenummeret for kontrolleret distribution til apotekspersonalet, inden ASPAVELI® kan udleveres

ASPAVELI® kan øge din risiko for at få alvorlige og livstruende infektioner. Alvorlige infektioner kan hurtigt blive livstruende og medføre døden, hvis de ikke opdages og behandles tidligt. Ring til din læge eller søg straks akuthjælp, hvis du har nogen af følgende tegn og symptomer på en alvorlig infektion:

- hovedpine og feber
- feber og udslæt
- feber med eller uden kulderystelser eller kuldegysen
- stakåndethed
- høj puls
- klam hud

- 
- hovedpine med nakke- eller rygstivhed
  - hovedpine med kvalme (du føler dig utilpas) eller opkastning
  - lysfølsomhed
  - muskelsmerter med influenzalignende symptomer
  - forvirring
  - store smerter eller ubehag

**Bær altid dette kort på dig** under behandling og i 2 måneder efter din sidste dosis. Din risiko for alvorlige infektioner kan fortsætte i flere uger efter din sidste dosis.

---

**Vis kortet til alle sundhedspersoner, der behandler dig.**

---

Patientkort

---

Referencenummer for kontrolleret distribution (CD)

---

Ordinerende læges navn

---

Ordinerende læges telefon