

Vaihe 1. Infuusion valmistelu

» Ota yhden injektiopullon pahvikotelo jääkaapista ja pidä huoneenlämmössä 30 minuutin ajan.

» Pese kädet ja ota esiin infuusiota varten kaikki tarvikkeet ja pumppu. Käytä valmisteluun alkoholipyyhkeellä puhdistettua pintaa.

Pumpun valinnasta ja hoitohenkilökunnan ohjeista riippuen varusteet voivat vaihdella.



1. Siirtoneula TAI neulaton siirtolaite lääkkeen ottamiseen injektiopullosta

2. Yhteensopiva ruisku

3. Infuusioletku/infuusiosarja

4. Alkoholipyyhkeet

5. Terävän jätteen säiliö

6. Läpinäkyvä sidos

Kuvasta puuttuvat infuusiopumppu ja pumpun käyttöohje

Vaihe 2. Tarkista injektiopullo ja siinä oleva neste

» Aspaveli-valmisteen on oltava kirkasta, väritöntä tai hieman kellertävää.

» Tarkista, ettei neste sisällä hiukkasia tai ole poikkeavan väristä.




Älä käytä jos suojakorkki puuttuu, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu tai jos liuos on sameaa tai sisältää hiukkasia.

Vaihe 3. Valmistele ja täytä ruisku

» Irrota suojakorkki.

» Puhdista tulppa uudella alkoholipyyhkeellä hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.



Vaihe 3. (jatkoa). Valmistele ja täytä ruisku

Vaihtoehto 1 – Kun käytät siirtoneulaa

» Kiinnitä steriili siirtoneula ruiskuun.

» Vedä ruiskuun ilmaa vetämällä mäntää taaksepäin 20 ml viivaan asti.

» Injektiopulloa on pidettävä pystyssä, kun työnnät neulaa pullon kumitulpan lävitse. Älä käännä injektiopulloa ylösalaisin.

» Paina varovasti ilma ruiskusta injektiopulloon. Varmista, ettei neulan kärki ole liuoksessa ennen kuin alat painaa ruiskusta ulos ilmaa injektiopulloon.

» Käännä pullo ja ruisku ylösalaisin.




» Kun siirtoneulan kärki on liuoksessa, voit alkaa vetää mäntää hitaasti ja täyttää ruiskua lääkeaineella.

» Irrota ruisku siirtoneulasta.

» Poista mahdolliset kuplat ruiskusta suuntaamalla ruiskun kärki ylöspäin ja napauttamalla ruiskua sormella.

» Liitä ruisku sinulle määrättyyn infuusiosarjaan (letku ja neula).

» Paina hyvin varovasti ruiskun mäntää ja täytä infuusiosarja lähes neulaan asti, kuten hoitohenkilökunta on opettanut.



Vaihe 3. (jatkoa). Valmistele ja täytä ruisku

Vaihtoehto 2 – Jos käytät neulatonta siirtolaitetta (esim. Mini-spike)

» Irrota kärjen suojakorkki, mutta varo koskemasta kärkeä.

» Työnnä kärki kumitulpan läpi.

» Avaa siirtolaitteen kansi ja kiinnitä ruisku.

» Käännä pullo ylösalaisin ja vedä liuos hitaasti ruiskuun. Minispiken kärjen on oltava nestepinnan alla, jotta voisit vetää kaiken nesteen.



» Irrota ruisku siirtolaitteesta.

» Poista kaikki kuplat kääntämällä ruiskun pää ylöspäin ja varovasti napauttamalla ruiskua sormella.

» Kiinnitä ruisku nyt sinulle määrättyyn infuusiosarjaan (letku ja neula).

» Paina hyvin varovasti ruiskun mäntää ja täytä infuusiosetti lähes neulaan asti, kuten hoitohenkilökunta on opettanut.

Tarkista, että oma siirtolaitteesi vastaa yllä esitettyä kuvausta.



Vaihe 4. Valmistele infuusiopumppu


» Valmistele pumppu, jonka olet saanut Aspaveli-valmisteen antoon. Noudata opastuksessa saamiasi ja käyttöohjeessa olevia neuvoja.



Vaihe 5. Valitse ja valmistele infuusiokohta tai -kohdat


» Voit valita infuusiokohdan olkavarresta, vatsasta, lantion alueelta tai reidestä.

Älä käytä samaa infuusiokohtaa kuin edellisellä kerralla.




» Jos annat infuusion kahteen eri kohtaan, niiden on oltava 7,5 cm etäisyydellä toisistaan ja vähintään 5 cm etäisyydellä navasta.

» Puhdista iho hoitohenkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.



Vaihe 6. Aseta ja kiinnitä infuusioneula(t)

- » Tartu neulasiivikkeistä, poista neulansuojus.
- » Nipistä toisella kädellä ihosta poimu.
- » Työnnä neula sisään kokonaan. Varmista teipillä, että neula pysyy paikallaan.
- » Toista, jos infuusiopaikkoja on useampi.
- » Tarkista, ettei neula ole joutunut verisuoneen kuten hoitohenkilökunta on opettanut.



Vaihe 7–8. Aloita ja päätä infuusio

- » Pumpustasi riippuen infuusion aloitus tapahtuu eri tavoin. Noudata hoitohenkilökunnan ja pumpun valmistajan ohjeita. Infuusio on aloitettava viipymättä sen jälkeen, kun neste on otettu ruiskuun.
- » Noudata välineiden valmistajan antamia infuusio-ohjeita infuusion päättämisestä.



Vaihe 9. Infuusion kirjaaminen

- » Rekisteröi hoitosi hoitohenkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.



Normaalisti kahteen infuusiokohtaan annettu hoito kestää 30 minuuttia ja yhteen noin 60 minuuttia.

Älä anna infuusiota alueille, joilla iho on arka, punoittava tai kova tai jossa on mustelma. Vältä tatuointeja, arpia tai venymisjälkiä.

Vaihe 10. Siivoa

- » Poista neula/neulat kun infuusio on päättynyt, peitä infuusion antokohta uudella sidoksella.
- » Irrota ruisku ja infuusiosarja pumpusta ja hävitä se yhdessä käytetyn kertakäyttömateriaalin kanssa hoitohenkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
- » Puhdista pumppu, jotta se on valmiina seuraavaa infuusiokertaa varten.



Seuraa mahdollisen vaikean infektion merkkejä

Ennen Aspaveli-hoidon aloittamista sait rokotteet. Rokotteet vähentävät vakavien infektioiden riskiä, mutta sitä ei voida täysin sulkea pois. Muistathan ottaa yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita:

- » Päänsärky ja kuume
- » Päänsärky, johon liittyy niskan tai selän jäykkyyttä
- » Kuume ja ihottuma
- » Päänsärkyä ja pahoinvointia tai oksentelua
- » Kuumetta ja mahdollisesti vilunväristyksiä
- » Silmien valoherkkyyttä
- » Hengenahdistusta
- » Lihaskipua ja flunssan kaltaisia oireita
- » Korkea syke
- » Sekavuutta
- » Nihkeä iho
- » Äärimmäistä kipua tai epämukavuutta

Muista



Aspaveli-hoito annetaan kaksi kertaa viikossa päivinä 1 ja 4, ellei lääkäri ole toisin määrännyt.



Oy, Swedish Orphan Biovitrum Ab
Äyritie 18, FI-01510 Vantaa
+358 (0) 201 558 840,
mail.fi@sobi.com, www.sobi.fi

NP-24553 | 11/2022



Aspaveli-valmisteen annostelu vaihe vaiheelta

Saat hoitohenkilökunnalta tämän oppaan, jonka avulla voit opetella antamaan Aspaveli-valmistetta itsellesi omatoimisesti. Muistathan myös lukea huolellisesti lääkepakkauksen mukana tulevan pakkauselosteen.

Jos sinulla on kysymyksiä hoidosta tai lääkkeen antamisesta, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

ASPVELI on tarkoitettu sellaisten aikuispotilaiden hoitoon, joilla on kohtausittainen yöllinen hemoglobiinivirtsaisuus (PNH) ja jotka ovat edelleen aneemisia vähintään 3 kuukautta kestäneen C5-estäjähoidon (eräs toinen PNH-lääke) jälkeen.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Keskustele lääkärin, hoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan osoitteessa www.fimea.fi.