



**HA ALLTID DET HÄR KORTET MED DIG
VISA DET FÖR ALL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-
PERSONAL SOM VÅRDAR DIG OCH OM DU
BEHÖVER SJUKHUSVÅRD**



Meddelande om sekretess och dataskydd
All information som du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Sobi's dataskyddspolicy och i enlighet med de syften för vilka den lämnas. Du hittar fullständig information om hur personuppgifter skyddas hos Sobi i vår policy som finns här: <https://sobi.fi/tietosuojakaytanto> (på finska). Om du inte samtycker till denna användning av dina uppgifter, ber vi dig att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna på webbsidan.

INFORMATION TILL BEHANDLANDE LÄKARE

Denna patient har ordinerats ASPAVELI® (pegcetakoplan), som kan öka patientens risk för allvarliga infektioner orsakade av bakterier som *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* och *Haemophilus influenzae* typ B.

- Allvarliga bakteriella infektioner kan snabbt bli livshotande eller dödliga om de inte upptäcks och behandlas i tid.
- Kontrollera patienten noga för tidiga tecken och symtom på allvarlig infektion och utvärdera omedelbart vid misstanke om en infektion. Behandla konstaterade infektioner utan dröjsmål.
- Kontakta patientens förskrivande läkare snarast möjligt vid misstanke om en allvarlig infektion.

Mer information om ASPAVELI® finns i den fullständiga produktresumén

Hälsa- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via www.fimea.fi.

Patienter som får ASPAVELI® ska alltid ha med sig detta kort. Patienten måste visa referensnumret för det kontrollerade distributionssystemet för apotekspersonalen innan ASPAVELI® får lämnas ut.

ASPAVELI® kan öka risken för allvarliga och livshotande infektioner. Allvarliga infektioner kan snabbt bli livshotande och leda till döden om de inte upptäcks och behandlas i tid. Kontakta omedelbart läkare eller sök akutvård om du får något av följande tecken och symtom på en allvarlig infektion:

- huvudvärk och feber
- feber och utslag
- feber med eller utan skakningar och frossa
- andfåddhet
- hög hjärtfrekvens
- kallsvettig hud

- huvudvärk med stel nacke eller stel rygg
- huvudvärk med illamående eller kräkningar
- ljuskänsliga ögon
- muskelvärk med influensaliknande symtom
- förvirring
- extrem smärta eller extremt obehag

Ha alltid detta kort med dig under behandlingen och i 2 månader efter den sista dosen. Risken för allvarliga infektioner kan kvarstå i flera veckor efter den sista dosen.

**Visa detta kort för all hälso-
och sjukvårdspersonal som vårdar dig**

Patientens namn

Referensnummer för det kontrollerade distributionssystemet

Förskrivarens namn

Förskrivarens telefonnummer