

Sådan administrerer du Aspaveli trin for trin

Du vil få undervisning og træning, så du kan tage dig af din egen behandling. Du har fået denne folder udleveret af sundhedspersonalet, da du har fået ordineret Aspaveli, og du har lært at administrere Aspaveli på egen hånd. Den skal ses som en støtte, når du selvadministrerer. Vi vil også gerne minde dig om at læse indlægssedlen, der følger med pakningen.

**Kontakt din læge eller sygeplejerske,
hvis du har spørgsmål eller bekymringer
om din behandling eller administration.**

Aspaveli er et lægemiddel til behandling af voksne patienter med paroxysmisk nokturn hæmoglobinuri (PNH), som har anæmi som følge af denne sygdom.



Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Du kan også indberette direkte via www.laegemiddelstyrelsen.dk



Trin 1. Klargør til infusionen

- » Tag en pakning ud af køleskabet, og lad den stå ved stuetemperatur i 30 minutter.

Tilbehøret kan variere, afhængigt af valg af pumpe og anvisninger fra sundhedspersonalet.



- » Vask hænderne. Stil alt det udstyr og din pumpe frem, som kræves til infusionen. Anvend en rengjort overflade til klargøringen.



1. Overførselsnål ELLER mini-spike (overførselsenhed uden nål) til at trække lægemidlet op af hætteglasset
 2. Kompatibel sprøjte
 3. Infusionsslange/infusionssæt
 4. Spritservietter
 5. Kanylebeholder
 6. Transparent forbindelse
- Vises ikke: Infusionspumpe og fremstillers brugsanvisning

Trin 3 fortsat. Klargør og fyld sprøjten



Mulighed 1 - Hvis du bruger en overførselsnål

- » Sæt den sterile overførselsnål på sprøjten.
- » Træk stemplet tilbage til 20 ml-stregen for at fylde sprøjten med luft.
- » Sørg for, at hætteglasset er i opret stilling (stabilt på et bord), når du trykker nålen gennem membranen på hætteglasset.
- » Sørg for, at spidsen af nålen ikke er i opløsningen, inden du begynder at trykke luften fra sprøjten ind i hætteglasset.
- » Vend flasken og sprøjten om og tilbage igen.
- » Mens overførselsnålens spids er i opløsningen, kan du begynde at trække langsomt i stemplet for at fylde sprøjten med lægemidlet.
- » Løsn sprøjten fra overførselsnålen.
- » Fjern eventuelle bobler ved at pege sprøjtestemplet opad og forsigtigt banke på sprøjten med fingeren.
- » Sæt sprøjten på det infusionssæt (slange og nål), som du har fået ordineret.
- » Tryk meget forsigtigt på sprøjtestemplet for at fylde infusionssættet næsten op til nålen, som din sundhedsperson har lært dig.



Trin 2. Tjek hætteglasset og væsken



- » Aspaveli er klar, farveløs til svagt gullig.
- » Kontrollér for partikler eller farveændringer i væsken.



Må ikke anvendes, hvis det beskyttende flip-off-låg mangler, hvis udløbsdatoen er overskredet, eller hvis opløsningen ser uklar ud eller indeholder partikler.

Trin 3 fortsat. Klargør og fyld sprøjten



Mulighed 2 – Hvis du anvender en mini-spike (overførselsenhed uden nål)

- » Tag beskyttelseshætten af spidsen, men pas på ikke at røre ved den.
- » Stik spidsen gennem gummiproppen.
- » Åbn låget på overførselsenheden, og tilslut sprøjten.
- » Vend flasken om og tilbage igen, og træk langsomt opløsningen op i sprøjten. Spidsen på hætteglasadapteren skal være under væskeniveau, for at du kan trække al væsken op.
- » Løsn sprøjten fra overførselsenheden.
- » Fjern alle bobler ved at pege sprøjtespidsen opad og forsigtigt banke på sprøjten med fingeren.
- » Sprøjten skal nu sættes på det infusionsæt (slange og nål), som du har fået ordineret.
- » Tryk meget forsigtigt på sprøjtestemplet for at fylde infusionssettet næsten op til nålen, som din sundhedsperson har lært dig.

Kontrollér, at netop den overførselsenhed, du har fået, svarer til beskrivelsen ovenfor.



Trin 3. Klargør og fyld sprøjten




- » Tag det beskyttende låg af uden at røre ved gummiproppen.
- » Rengør gummiproppen ifølge anvisninger fra sundhedspersonalet.



Trin 4. Klargør infusionspumpen

- » Klargør den pumpe, som du har fået udleveret til administration af Aspaveli. Følg de anvisninger, du får under oplæringen, og som står i den trinvis vejledning til netop den pumpe, du har fået ordineret af sundhedspersonalet.



Trin 5. Vælg og forbered infusionsstedet eller infusionsstederne





- » Du kan vælge mellem: overarme, mave, hofte eller lår.

Hvis du vælger to infusionssteder, vil infusionstiden være hurtigere, end hvis du vælger ét sted.

Vælg et andet sted end det, du valgte sidst.

Undgå øm, rød eller hård hud. Også blå mærker, tatoveringer, ar eller strækmærker.



- » Hvis du vælger to infusionssteder, skal de være mindst 7,5 cm fra hinanden og mindst 5 cm fra navlen.
- » Rens huden i henhold til anvisninger fra sundhedspersonalet.





Trin 6. Indfør og fiksér infusionsnålen(e)

- » Tag fat om nålevingerne, fjern nålebeskyttelsen.
- » Tag med den anden hånd godt fast om huden og klem den sammen.
- » Før nålen helt ind. Sørg for, at nålen sidder stabilt ved hjælp af tape.
- » Gentag, hvis du har flere infusionssteder.
- » Fastgør nålen (nålene) med steril gaze og tape, eller en transparent forbindelse over infusionsstedet (stederne).



Trin 10. Oprydning

- » Tag nålen(e) ud, når infusionen er fuldført. Dæk med en ny forbindelse.
- » Frakobl sprøjten og infusionssættet af pumpen, og bortskaf det sammen med brugt engangsmateriale ifølge anvisninger fra sundhedsvæsenet.
- » Rengør pumpen, så den er klar til brug inden næste infusion.



Husk



Brug appen **florio PNH** til at indstille påmindelser.



Behandling med Aspaveli finder sted **to gange ugentligt**, på dag 1 og 4, medmindre din læge har ordineret andet.

Trin 7-8. Start og færdiggør infusionen

- » Hvordan man starter infusionen, afhænger af, hvilken pumpe du har. Sørg for at følge anvisningerne fra personalet og fremstilleren af pumpen.
- » Følg anvisningerne fra for færdiggørelsen af infusionen fra fremstilleren af enheden.



Trin 9. Registrér infusionen

- » Registrér din behandling som anvist af din sundhedsperson.
- » I appen florio PNH kan du bl.a. registrere dine behandlinger.



Normalt tager infusionen ca. 30 minutter, hvis man har valgt to infusionssteder, og ca. 60 minutter, hvis man har valgt et infusionssted.

Vær opmærksom på tegn på alvorlig infektion

Før du påbegyndte behandlingen med Aspaveli, blev du vaccineret. Vaccinen reducerer risikoen for alvorlige infektioner, men ikke alle alvorlige infektioner kan helt udelukkes. Vi vil derfor minde dig om, at du skal kontakte lægen, hvis du oplever nogle af de følgende symptomer:

- » hovedpine og feber
- » feber og udslæt
- » feber med eller uden kulderystelser eller kuldegysen
- » stakåndethed
- » høj puls
- » klam hud
- » hovedpine med nakke- eller rygstivhed
- » hovedpine med kvalme eller opkastning
- » lysfølsomhed
- » muskelsmerter med influenzalignende symptomer
- » forvirring
- » store smerte eller ekstremt ubehag



Swedish Orphan Biovitrum A/S
Sorgenfrivej 17, 2800 Kongens Lyngby
+45 3296 6869, mail.dk@sobi.com
www.sobi.com/denmark

NP-37151 | 09/2024